



行政院農業委員會臺中區農業改良場 新聞稿

彰化縣大村鄉松槐路 370 號

中華民國 105 年 03 月 28 日

「荔枝銹蟎及荔枝椿象已在中部地區零星發生，臺中區農業改良場籲請農友加強果園監測及提早防範，以避免損失」

行政院農業委員會臺中區農業改良場調查中部地區荔枝銹蟎及荔枝椿象發生之情形，目前分別於南投縣南投市及臺中市東勢區等地區，已零星發生，為避免造成經濟損失，臺中場呼籲荔枝、龍眼農友儘速加強果園監測，及早防範以避免損失。

荔枝銹蟎又稱荔枝氈蟎，主要為害荔枝及龍眼，為害狀俗稱腫葉病或毛氈病，每年 3~5 月間發生較為嚴重，可為害嫩葉、花穗、幼果及嫩枝。被害葉部呈針狀凸出，葉背產生白色茸毛凸出，後期葉表轉腫脹，葉背之茸毛也轉變成褐色；受害枝梢及果實毛茸狀凸起，徵狀與葉片相似；受害果實變小、味淡且果肉褐化，毫無商品價值。

荔枝椿象主要為害荔枝及龍眼，每年 3~5 月出現，若蟲五齡，體色紅艷具白色條紋，成蟲體色黃褐盾狀，以刺吸式口器吸食汁液，導致落花、落果及嫩枝枯萎，並引起荔枝果實酸腐病之發生，本蟲分泌物會造成皮膚過敏，勿徒手抓取害蟲。

目前植物保護手冊防治荔枝銹蟎藥劑有 40.64%加保扶水懸劑稀釋 800~1200 倍（宜在幼果期施用）、80%可濕性硫磺水分散性粒劑稀釋 320 倍及 80%可濕性硫磺可濕性粉劑稀釋 320 倍等藥劑，農友可輪流使用。

荔枝椿象在龍眼上之推薦藥劑有 40.64%加保扶水懸劑稀釋 1000 倍（宜在幼果期施用）、85%加保利可濕性粉劑稀釋

850 倍及 50%芬殺松乳劑稀釋 1000 倍等藥劑，農友可輪流使用。

聯絡人：推廣課 曾康綺
電話：(04)8523101 轉 431
e-mail：tsengyj@tdais.gov.tw

撰稿人：環境課 葉士財
電話：(04)8523101 轉 320
e-mail：shihtsai@tdais.gov.tw



荔枝銹蟎為害葉片及花穗



荔枝銹蟎為害葉片



荔枝椿象若蟲



荔枝椿象群聚為害