



行政院農業委員會臺中區農業改良場 新聞稿

彰化縣大村鄉松槐路 370 號

中華民國 106 年 06 月 23 日

「葡萄露菌病發生警報」

葡萄露菌病已發生，籲請農友及早防治

由於近日氣候高溫高濕，露菌病已於中部地區部分葡萄園發生，行政院農業委員會臺中區農業改良場籲請葡萄農友儘速進行防治，以免影響植株健康與後續葡萄產量。

該場于逸知助理研究員表示：露菌病主要危害葡萄葉片及幼果，受害處會產生白色黴狀物的病原菌，在高溫高濕的環境下藉由風、雨快速傳播擴散，造成危害；建議農民可於葡萄露菌病發病初期使用 50% 達滅芬可濕性粉劑 4,000 倍、60.8% 氟比拔克水懸劑 1,200 倍、76.5% 銅滅達樂可濕性粉劑 1,000 倍、72% 鋅錳克絕可濕性粉劑 750 倍及 64% 甲鋅毆殺斯可濕性粉劑 600 倍等藥劑進行全園防治；亦可搭配亞磷酸、波爾多液等資材進行植株保護與病害預防；並適當修剪枝條以保持通風，可減緩病菌的蔓延。農友若有露菌病相關防治問題，歡迎洽詢臺中場植物保護研究室。

聯絡人：臺中區農業改良場作物推廣課 蔡本原助理研究員

電話：04-8523101#420

e-mail：tsaiiby@tdais.gov.tw

撰稿人：臺中區農業改良場作物環境課 于逸知助理研究員

電話：04-8523101#320

e-mail：onefish@tdais.gov.tw



露菌病感染初期特徵：葉片出現黃綠色角斑。



露菌病導致葉背出現白色黴狀物構造。