



## 行政院農業委員會臺中區農業改良場 新聞稿

彰化縣大村鄉松槐路 370 號

中華民國 111 年 5 月 4 日

### 時值荔枝椿象若蟲與荔枝細蛾發生期，臺中場籲請農友及早防治。

目前中部地區荔枝花期已結束，行政院農業委員會臺中區農業改良場呼籲農友應把握防治時機，強化果園內荔枝椿象若蟲與細蛾類害蟲管理，以降低害蟲密度，避免影響收成。

每年三、四月為荔枝椿象的主要產卵期，五月其若蟲開始大量出現，危害時期可持續至七、八月。由於若蟲有群集性，且體型較小、對藥劑敏感，若能把握此時再次防治，可有效降低若蟲危害，也可降低來年田間蟲源。

荔枝細蛾大約於荔枝落花後 25-30 天開始危害幼果，待荔枝果實長度發展至 1.5 公分左右、果串開始微微下垂時即應啟動防治。藥劑防治目標主要為成蛾，噴灑時並非僅針對果串噴灑，而應整株進行防治，並注意田間衛生與落果管理。

目前荔枝細蛾類的推薦(含緊急)用藥共有加保利、芬殺松、撲滅松、第滅寧、益洛寧、賽洛寧及亞滅培 7 種；荔枝椿象推薦藥劑則為丁基加保扶、賽洛寧及亞滅培 3 種。臺中場籲請農友及早以推薦藥劑進行防治，並於採收及整枝修剪後進行清園，以利來年害蟲管理。另荔枝椿象若蟲受干擾後，亦會由臭腺噴射具有刺激性的分泌物，造成人體灼傷，該場提醒農友田間作業時應做好防護。

聯絡人：臺中區農業改良場農業推廣課 蔡本原助理研究員

電 話：04-8523101#436

e-mail：[tsaiby@tdais.gov.tw](mailto:tsaiby@tdais.gov.tw)

撰稿人：臺中區農業改良場作物環境課 于逸知助理研究員

電 話：04-8523101#324

e-mail：[onefish@tdais.gov.tw](mailto:onefish@tdais.gov.tw)



荔枝椿象若蟲數量過多時，將會造成果樹危害，應及早防治。



荔枝細蛾於幼果期即會鑽入蛀食種仁，應提早預防。