



# 行政院農業委員會臺中區農業改良場 新聞稿

彰化縣大村鄉松槐路 370 號

中華民國 111 年 10 月 11 日

## 「水稻飛蝨類害蟲發生警報」

### 水稻飛蝨類害蟲密度上升，籲請農民及時防治

彰化、南投及臺中三縣市水稻於近期陸續進入抽穗期，經調查發現特定通風較差田區的稻叢基部，有白背飛蝨與褐飛蝨之成蟲及若蟲聚集危害。行政院農業委員會臺中區農業改良場特籲請農友注意飛蝨類害蟲的防治工作，以確保水稻生產。

臺中區農業改良場表示，白背飛蝨與褐飛蝨之成、若蟲偏好成群聚集水稻基部及中段吸取稻液危害，受害輕者基葉黃化，重者全株枯萎、倒伏，造成「蝨燒」現象。農友可檢視稻叢基部，若發現每叢水稻之飛蝨數量達 5 隻時，應即刻進行防治作業。

該場進一步說明，對於白背飛蝨及褐飛蝨的防治，噴藥前田間水位保持 3 - 5 公分，促使飛蝨類蟲體向上移動，並將藥液均勻噴施全株，以提高防治效果。農友進行防治可選用的藥劑，包括：50%速殺氟水分散性粒劑 8,000 倍、10% 氟尼胺水分散性粒劑 2,000 倍、10% 賽速安水溶性粒劑 4,000 倍、16% 可尼丁水溶性粒劑 3,000 倍、25% 派滅淨可濕性粉劑 1,500 倍或 20% 達特南水溶性粒劑 3,000 倍等。

聯絡人：蔡本原 助理研究員

電話：(04)8523101 轉 436

e-mail：tsaiby@tdais.gov.tw

撰稿人：廖君達 副研究員

電話：(04)8523101 轉 330

e-mail：liaoct@tdais.gov.tw



◎飛蟲類群集水稻吸食汁液危害狀



◎褐飛蟲成蟲



©飛蟲類害蟲嚴重危害造成稻株枯萎及倒伏