



## 農業部臺中區農業改良場 新聞稿

彰化縣大村鄉松槐路 370 號

中華民國 113 年 5 月 1 日

### **時值荔枝細蛾發生期，臺中農改場籲請農友及早防治。**

目前中部地區荔枝花期已結束，農業部臺中區農業改良場呼籲農友應把握防治時機，強化果園內荔枝細蛾類害蟲管理，以降低害蟲密度，確保收成。

臺中區農改場于逸知助理研究員表示，荔枝細蛾大約於荔枝落花後 25-30 天開始為害幼果，待荔枝果實長度發展至 1.5 公分左右、果串開始微微下垂時即應啟動防治。于逸知進一步說明細蛾成蟲白天多隱匿於植株分枝、縫隙及陰影處，夜間才會飛到果串上產卵，故噴藥時除針對果串噴灑外，應整株進行防治，並注意田間衛生與落果管理，以提高防治成效。

目前荔枝細蛾類的推薦(含緊急)用藥共有加保利、芬殺松、撲滅松、第滅寧、益洛寧、賽洛寧、賽安勃及亞滅培 8 種。臺中農改場提醒農友及早施用藥劑進行防治，施藥時應正確使用已核准登記藥劑，以達到防治效果，同時落實藥劑輪替使用，避免害蟲產生抗藥性，並遵守各藥劑施用後之安全採收期，此外採收及整枝修剪後須確實清園，以減少荔枝細蛾孳生源及隱蔽處。

聯絡人：農業推廣科 張萌芬 助理研究員

電話：04-8523101#422

e-mail：[mfchang@tcdares.gov.tw](mailto:mfchang@tcdares.gov.tw)

撰稿人：作物環境科 于逸知 助理研究員

電話：04-8523101#324

e-mail：[onefish@tcdares.gov.tw](mailto:onefish@tcdares.gov.tw)



當荔枝果粒發育至約 1.5-2 公分時，荔枝細蛾即會前來產卵為害，  
為害症狀主要為落果。



荔枝細蛾於荔枝幼果期鑽入蛀食種仁，應提早預防。