

行政院農業委員會台中區農業改良場新聞稿

彰化縣大村鄉田洋村松槐路 370 號

二期稻作瘤野螟發生警報

水稻瘤野螟成蛾陸續羽化，台中區農業改良場提出防治對策，籲請農民掌握防治時機，以減少本害蟲之發生與蔓延

九十六年九月廿七日

本場轄區內彰化、南投、台中等縣市之二期稻作正值孕穗期，經台中區農業改良場病蟲害發生預測，發現 8 月中、下旬瘤野螟幼蟲零星危害稻葉致使捲葉的情形，9 月下旬起陸續有新一代成蛾羽化。本場籲請農民注意水稻瘤野螟防治工作，以確保稻米生產。

瘤野螟又稱為稻縱捲葉蟲，初孵化幼蟲啃食嫩葉葉肉，形成細白線之食痕；2 齡後會將葉片捲成筒狀縱苞，並藏匿其中，取食上表皮及葉肉，殘留長條白色斑痕；一個捲葉內往往藏匿幼蟲 1 隻，通常啃食數條食痕後，便遷移他葉繼續危害，每隻幼蟲可危害 3-6 片稻葉。

台中區農業改良場籲請農民掌握防治適期，於田間成蛾發生盛期後 7 天進行第 1 次施藥，或每叢稻株捲葉數平均達 3 葉〔每叢稻株可檢視到 1 隻幼蟲〕以上時開始施藥，於第 1 次施藥後 14 天再行第 2 次處理可得到最好的防治效果。

本害蟲防治藥劑種類如下：(一) 2.8% 賽洛寧乳劑 2,000 倍；(二) 10% 得芬諾可濕性粉劑 1,000 倍；(三) 19% 矽護芬水基乳劑 2,000 倍等；其他推薦藥劑及施藥方法請參照植物保護手冊。並應注意合理施用肥料，避免偏施氮肥造成稻株生長過密或過於嫩綠，可減少蟲害的發生與蔓延。

本場新聞連絡人：推廣課 楊顯章 電話：(04)8520584

e-mail: yangsc@tdais.gov.tw 傳真：(04)-8530574

稻作病蟲害防治諮詢：陳啟吉、林金樹、廖君達

電話：04-8523101 轉 330



瘤野螟幼蟲及捲葉



瘤野螟危害狀



瘤野螟成蛾