

行政院農業委員會台中區農業改良場新聞稿

彰化縣大村鄉松槐路 370 號

「二期稻作白葉枯病發生警報」

九十六年九月十九日

韋帕颱風挾帶強風豪雨，適合水稻白葉枯病發生，台中區農業改良場提出防治對策，籲請農友掌握防治時機，減少本病害之發生與蔓延

本場轄區內彰化、南投、台中等縣市水稻歷經8月中旬聖帕颱風強風吹襲，稻葉出現明顯破損現象，部分鄉鎮水稻田區已零星出現白葉枯病罹病徵狀，且田間殘留多量的病原菌。時值韋帕颱風來襲，挾帶的強風及豪雨，有助於白葉枯病的發生與蔓延。台中區農業改良場據此發佈水稻白葉枯病發生警報，呼籲區內農民注意白葉枯病的防治工作。

葉枯型的白葉枯病，病斑常起源於葉緣，病菌由水孔侵入，在葉片邊緣形成波浪狀黃色條紋病斑，隨著葉脈往下蔓延；至於彰化縣花壇、秀水一帶常見的熱帶黃化型白葉枯病，罹病株下方老葉仍正常，新葉全葉呈淡黃色。農民應於韋帕颱風過後，田間稻株出現白葉枯病病徵初期施用10%鏈四環黴素可濕性粉劑1,000倍或10%克枯爛可濕性粉劑1,000倍加展著劑施用。一旦發病，晨露未乾前，避免進入田區或施藥，減少病菌的傳播。

田間若有紋枯病發生時，防治稻熱病時可同時選擇混合下列紋枯病防治藥劑中之一種：25% 賓克隆可濕性粉劑2,000 倍、20% 福多寧水懸劑2,000倍、10% 維利黴素溶液2,500 倍、10% 菲克利乳劑1,500 倍等。如欲使用其他防治藥劑則請參照植保手冊。

本場新聞連絡人：楊顯章

電話：04—8523101 轉 431

傳真：04—8524784

稻作病蟲害防治諮詢：陳啟吉、林金樹、廖君達

電話：04-8523101 轉 330



葉枯型水稻白葉枯病病徵



黃化型水稻白葉枯病病徵