

## 「中部地區黑角舞蛾發生警報」

九十六年三月二十七日

為害果樹類的黑角舞蛾幼蟲已在中部地區陸續孵化，台中區農業改良場提出防治對策，籲請果農掌握防治時機，以減少本害蟲之發生與蔓延

台中區農業改良場近日派員赴中部地區監測黑角舞蛾發生情形，於南投縣草屯鎮荔枝監測點，發現該蟲蟲卵已陸續孵化。往年受害區域包括八卦山脈地區（彰化縣彰化市、二水、員林、田中、芬園、花壇、社頭、大村）、南投縣（南投市、名間鄉、中寮鄉、集集鎮、草屯鎮、鹿谷鄉）、台中縣（霧峰鄉、新社鄉、太平市）及台中市等鄉鎮，請務必加強警戒及防治工作。黑角舞蛾為害果園包括荔枝、龍眼、楊桃、蓮霧、番石榴、枇杷、柿子及梨等。為避免造成為害，台中區農業改良場呼籲農民儘速加強自有果園的防治作業。

黑角舞蛾幼蟲，體長約 4~6 公分，體色灰褐與黃褐色參雜相間，每節有 3 對疣突，顏色變化頗大，其上被覆數束黑褐色之堅硬刺毛。幼蟲雜食性，可為害多種植物，並食盡嫩枝及樹葉，嚴重時造成植株枯死。

黑角舞蛾之防治可參考植物保護手冊蝶蛾類之防治推薦藥劑，使用 2.8% 賽洛寧乳劑稀釋 1,000 倍、2.8% 第滅寧乳劑稀釋 1,000 倍或 20% 芬化利乳劑稀釋 3,000 倍進行防治。



黑角舞蛾六齡幼蟲



黑角舞蛾初孵化幼蟲