

行政院農業委員會台中區農業改良場新聞稿

彰化縣大村鄉田洋村松槐路 370 號

二期稻作瘤野螟及紋枯病發生警報

水稻瘤野螟成蛾陸續羽化及出現紋枯病病徵，台中區農業改良場提出防治對策，籲請農民掌握防治時機，以減少病蟲之發生與蔓延

九十八年九月八日

本場轄區內彰化、南投、台中等縣市之二期稻作陸續進入幼穗形成期，經台中區農業改良場派員田間調查，發現 8 月下旬瘤野螟幼蟲零星危害稻葉致使捲葉的情形，9 月 4 日起陸續有新一代成蛾羽化。此外，早植稻田區已可檢視到紋枯病初期病徵。本場籲請農民注意水稻瘤野螟及紋枯病的防治工作，以確保稻米生產。

瘤野螟又稱為稻縱捲葉蟲，初孵化幼蟲啃食嫩葉葉肉，形成細白線之食痕；2 齡後會將葉片捲成筒狀縱苞，並藏匿其中，取食上表皮及葉肉，殘留長條白色斑痕，每隻幼蟲可危害 3 - 6 片稻葉。台中區農業改良場籲請農民掌握防治適期，於田間成蛾發生盛期後 7 天進行第 1 次施藥，於第 1 次施藥後 14 天再行第 2 次處理可得到最好的防治效果。農民可選用下列藥劑進行防治：2.8%賽洛寧乳劑 2,000 倍、或 10%得芬諾可濕性粉劑 1,000 倍等；其他推薦藥劑及施藥方法請參照植物保護手冊。

田間若有紋枯病發生時，防治瘤野螟時可同時選擇混合下列紋枯病防治藥劑中之一種：25% 賓克隆可濕性粉劑 2,000 倍、20% 福多寧水懸劑 2,000 倍、10% 維利黴素溶液 2,500 倍、10%菲克利乳劑 1,500 倍等。此外，應注意合理施用肥料，避免偏施氮肥造成稻株生長過密或過於嫩綠，可減少病蟲害的發生與蔓延。

本場新聞連絡人：推廣課 楊顯章 電話：(04)8520584

e-mail: yangsc@tdais.gov.tw 傳真：(04)-8530574

稻作病蟲害防治諮詢：廖君達、郭建志

電話：04-8523101 轉 330



瘤野螟捲葉危害狀



瘤野螟幼蟲



瘤野螟成蛾



紋枯病病徵