

行政院農業委員會台中區農業改良場新聞稿

彰化縣大村鄉松槐路 370 號

葡萄露菌病已零星發生，台中場籲請農民加強防治

99 年 3 月 15 日

台灣主要葡萄產區在彰化縣、台中縣及南投縣等地，葡萄露菌病是葡萄生產之關鍵病害，一般開始發生於 4-5 月梅雨季節，然二月份以來連續之降雨及氣溫變化劇烈，致使部份地區零星發生葡萄露菌病，較往年提早發生情形，台中區農業改良場據此發佈葡萄露菌病警報，呼籲農民加強防治，以避免疫情蔓延擴大。

葡萄露菌病主要發生在葉背面，嫩莖、花穗、幼小果粒及果軸亦皆可被害。罹病處初呈水浸狀，隨後產胞，如白霜覆蓋一般，造成組織褐化，隨後組織壞疽而呈角斑狀；罹病急速時，葉片產生孢子滿佈全葉隨後黃化枯萎掉落。果軸罹病時，呈暗褐色並常腫大扭曲，造成果粒水浸狀褐化，隨後脫落。


發病初期可使用 50%達滅芬可濕性粉劑 4,000 倍、68.75%氟比拔克水懸劑 1,200 倍、76.5%銅滅達樂可濕性粉劑 1,000 倍、72%鋅錳克絕可濕性粉劑 750 倍及 64%甲鋅毆殺斯可濕性粉劑 600 倍等。除上列藥劑外，尚可選用植物保護手冊推薦在葡萄露菌病的其它藥劑防治之(植物保護手冊網址：<http://www.tactri.gov.tw/htdocs/ppmtable/>)。此外，適當修剪以保持通風，可減緩病菌的蔓延。

連絡人：楊顯章


電話：04-8523101 轉 431 傳真：04-8524784

撰寫人：劉興隆、沈原民

電話：04-8523101 轉 321 傳真：04-8520914



葡萄露菌病葉片病徵



葡萄露菌病危害幼果病徵