

# 行政院農業委員會臺中區農業改良場新聞稿

彰化縣大村鄉松槐路 370 號

## 「一期稻作葉稻熱病發生警報」 99 年 3 月 25 日

中部地區葉稻熱病來了，臺中區農業改良場籲請農友注意防治，以減少本病害之發生與蔓延

臺灣中部地區一期稻作生育正值分蘖盛期，行政院農業委員會臺中區農業改良場派員調查彰化縣社頭鄉、北斗鎮及台中縣霧峰鄉之觀察田已發現部分稻田出現葉稻熱病感染型病斑，復以最近氣候陰晴不定，極適合葉稻熱病之發生與蔓延。為避免造成為害，特別加強呼籲農民儘速加強葉稻熱病的防治工作。

中部地區葉稻熱病通常在 3 月下旬至 4 月間發生，發病初期先於葉面上形成褐色或暗綠色小斑點，如環境適合擴大成紡錘形，此時病斑周圍呈黃色，中間赤褐色，內部灰白色，嚴重時葉片枯萎甚至全株枯死，使整塊田成火燒狀而致無法收成。

水稻葉稻熱病之防治藥劑可參考植物保護手冊，適時選用正確藥劑實施防治工作，更應要注意病勢進展，當發現葉片出現灰綠色感病型新病斑時，應即施藥防治。預防性的藥劑有 6%撲殺熱粒劑，於發生前 7 天施用，每公頃每次用藥量 30 公斤，田間應保持 3~5 公分水位，持續 4~5 天。若已發現初期病斑時，進行防治藥劑有 75%三賽唑可濕性粉劑 3000 倍、40%亞賜圃乳劑 1,000 倍、嘉賜三賽唑可濕性粉劑 1,500 倍、15%加普胺水懸劑 2,000 倍或 50%護粒松乳劑 1,000 倍等，並且在 10 天後再施藥一次。推薦藥劑除上列外，農友並可選用植物保護手冊內之其他推薦藥劑進行防治。

本場新聞連絡人：推廣課 楊顯章 電話：(04)8520584

e-mail：yangsc@tdais.gov.tw 傳真：(04)-8530574

撰稿人、稻作病蟲害防治諮詢：廖君達、郭建志

電話：04-8523101 轉 330



水稻葉稻熱病感染型病斑



水稻葉稻熱病嚴重罹病呈火燒狀