行政院農業委員會臺中區農業改良場新聞稿

彰化縣大村鄉松槐路 370 號

「水稻葉稻熱病發生警報」　　101 年 3 月 21 日

水稻秧砧已出現葉稻熱病初期病斑，籲請農民注意防治

中部地區一期稻作正值分蘖盛期，行政院農業委員會臺中區農業改良場派員調查彰化縣田中、二水及溪州等鄉鎮的水稻觀察田，發現供作葉稻熱病發生監測的秧砧已出現感染型病斑，復以近來氣候陰晴不定，極適合葉稻熱病的發生與蔓延。為避免造成為害，呼籲農民儘速加強葉稻熱病的防治工作。

預防重於治療是防治水稻葉稻熱病的不二法門。臺中區農業改良場推廣農民應用秧砧來偵測葉稻熱病的發生時機，當秧砧稻苗的葉片出現葉稻熱病感染型病斑，約 7~10 天後，本田的稻叢將會開始罹病。農民可根據此現象即刻進行預防性施藥，有效減緩葉稻熱病對水稻的危害。

中部地區葉稻熱病通常在 3 月下旬至 4 月間發生，發病初期先於葉面上形成褐色或暗綠色小斑點，如環境適合則擴大成紡錘形，此時病斑周圍呈黃色，中間赤褐色，內部灰白色，嚴重時葉片枯萎。

臺中區農業改良場籲請農友注意水稻的生長，當葉片出現灰綠色感病型病斑，選用水稻葉稻熱病推薦藥劑進行防治。預防性的藥劑為 6%撲殺熱粒劑，每公頃用藥量 30 公斤，田間應保持 3~5 公分水位，持續 4~5 天。若已發現初期病斑時，防治藥劑可選用 75%三賽唑可濕性粉劑 3000 倍、40%亞賜圃乳劑 1,000 倍、嘉賜三賽唑可濕性粉劑 1,500 倍、15%加普胺水懸劑 2,000 倍或 50%護粒松乳劑 1,000 倍等。

連絡人：推廣課 曾康綺 電話：(04)8523101 轉 431

e-mail：tsengyj@tdais.gov.tw 傳真：(04)8524784

水稻葉稻熱病感染型病斑

水稻秧砧作為偵測葉稻熱病發生的工具