行政院農業委員會臺中區農業改良場新聞稿

彰化縣大村鄉松槐路 370 號

「水稻瘤野螟發生警報」　　101 年 10 月 1 日

水稻瘤野螟正值成蛾盛期，籲請農民掌握黃金第 7 天加強防治

行政院農業委員會臺中區農業改良場調查水稻瘤野螟發生情形，發現轄內偏施氮肥田區之水稻葉片於 9 月中旬明顯出現捲葉，復以 9 月 26 日前後出現較大量的瘤野螟新一代成蛾。為避免造成危害，呼籲農民於 10 月 3 日起加強水稻瘤野螟的防治工作。

臺中區農業改良場場長張致盛博士指出，正確的施藥時機是病蟲害防治成敗的關鍵。當瘤野螟成蛾盛期後 7 天，初孵化幼蟲直接暴露在缺乏保護的環境，正是施藥防治的黃金時間。一旦幼蟲將葉片縱捲成苞隱匿其中取食，幼蟲將得到水稻葉片的保護，致使防治成效不佳。

臺中區農業改良場表示，瘤野螟又稱為稻縱捲葉蟲，初孵化幼蟲啃食嫩葉葉肉，形成細白線之食痕；2 齡後會將葉片捲成筒狀縱苞，並藏匿其中，取食上表皮及葉肉，殘留長條白色斑痕。農民應於田間成蛾發生盛期後 7 天選用下列藥劑進行防治，包括 24.7%賽速洛寧膠囊水懸混劑 3,000 倍、15%布得芬諾可濕性粉劑 1,000 倍或 50%培丹水溶性粉劑 1,200 倍等。

連絡人：推廣課 曾康綺 電話：(04)8523101 轉 431

e-mail：tsengyj@tdais.gov.tw 傳真：(04)8524784

瘤野螟捲葉危害狀

捲葉中的瘤野螟幼蟲

瘤野螟成蛾