

「水稻褐飛蟲發生警報」

101 年 10 月 23 日

水稻褐飛蟲已零星發生，籲請稻農掌握防治時機

行政院農業委員會臺中區農業改良場調查轄內水稻褐飛蟲發生情形，發現彰化縣花壇、秀水及田中等鄉鎮之水稻田已零星出現褐飛蟲危害。為避免危害持續擴大，呼籲農民加強水稻褐飛蟲的防治工作。

臺中區農業改良場場長張致盛博士指出，褐飛蟲之成、若蟲均偏好成群聚集水稻基部吸取稻液危害，受害輕者基葉黃化，重者全株枯萎、倒伏，造成「蟲燒」現象。農民應檢視稻叢基部，若發現每叢水稻之褐飛蟲達 5 隻時，即刻進行防治作業。

臺中區農業改良場表示，由於褐飛蟲偏好成群棲息於稻叢基部，噴藥前應先將田間水位保持 3-5 公分，促使褐飛蟲蟲體向上移動，以提高防治效果。農民可選用下列藥劑進行防治，包括 10% 氟尼胺水分散性粒劑 2,000 倍、10% 賽速安水溶性粒劑 4,000 倍、16% 可尼丁水溶性粒劑 3,000 倍、25% 派滅淨可濕性粉劑 1,500 倍或 20% 達特南水溶性粒劑 3,000 倍等。



褐飛蟲成蟲



褐飛蟲嚴重危害造成稻株枯萎及倒伏