

行政院農業委員會臺中區農業改良場新聞稿

「中部地區荔枝銹蟎發生警報」

102年3月25日

荔枝的銹蟎已在中部地區零星發生，臺中區農業改良場籲請果農加強果園防治作業，以減少銹蟎之蔓延與為害

行政院農業委員會臺中區農業改良場調查中部地區荔枝銹蟎發生情形，於南投縣南投市、中寮鄉及臺中市太平區等荔枝監測點，發現該銹蟎已零星發生，為避免造成經濟損失，臺中場呼籲農民儘速加強果園的防治作業。

目前植物保護手冊防治荔枝銹蟎推薦藥劑有，40.64%加保扶水懸劑稀釋800~1200倍（宜在幼果期施用）、80%可濕性硫黃水分散性粒劑稀釋320倍、80%可濕性硫黃可濕性粉劑稀釋320倍及75%可濕性硫黃粉劑稀釋300倍等藥劑，農友可輪流使用。

荔枝銹蟎 *Aceria litchi* (Keifer) 又稱荔枝氈蟎，為害狀俗稱腫葉病或毛氈病，每年3~5月間發生較為嚴重，蟲體細小乳白色，可為害嫩葉、花穗、幼果及嫩枝。被害部位由淺綠色轉為深綠色，繼而有針狀凸出，葉背產生白色茸毛，被害部逐漸加厚，茸毛加多，葉表腫脹突出，光滑如癭瘤狀，彎曲、葉背之茸毛也由白色變成褐色；受害枝梢之荔枝果實變小、味淡且果肉褐化，毫無商品價值。



荔枝銹蟎嗜食葉片引起新葉腫葉及變形



荔枝銹蟎嗜食花穗引起毛茸徵狀

連絡人：推廣課 曾康綺

電話：(04)8523101 轉 431

e-mail：tsengyj@tdais.gov.tw

傳真：(04)8524784