

因應103年節氣白露與中秋節重疊， 轉知文旦柚促成栽培資訊

文／陳盟松

文旦柚為國人歡度中秋佳節的應景水果，因民眾送禮習慣，文旦柚銷售高峰多在中秋節前，佳節過後文旦柚價格即逐漸下跌。中彰投文旦柚栽培面積共287公頃，產量約4,732公噸。文旦柚於每年三月上旬開花，果實採收期多以白露節氣為指標，因此白露與中秋節間的相隔日數長短則會影響到農民的文旦柚銷售。今(103)年節氣白露9月8日與中秋節為同一日，為減緩文旦柚銷售期短可能導致的產銷壓力，農糧署特請嘉義大學提供「文旦促成栽培」資料供農友栽培參考。若農友對於資料內容有疑問，可洽本場作物改良課果樹研究室04-8523101轉240或嘉義大學園藝系05-2717429詢問。

2014年文旦促成栽培

嘉義大學園藝系 Tel: 05-2717429

因應2014年9月白露與中秋重疊影響產銷

*由採收導回文旦栽培作業，提早2-3星期

1. 2013年12月下旬～2014年元月上旬，行冬季修剪(清園)及施用基肥(有機肥+台肥5號或39號或43號)，酸性土壤加石灰石資材改良土壤pH。
2. 元月中旬果園輕灌水
3. 元月下旬冬季防治：
亞磷酸鉀1,000倍+殺蟲劑+尿素500倍+油劑(夏油、機油或園藝油)100倍。防治越冬蟲害，土壤太乾燥不可噴油劑。
4. 冬季防治後果園充分灌水，催芽。
5. 2月下旬至3月上旬開花及春梢期，2013年文旦油脂病發生普遍，加強新梢保護：
亞磷酸鉀1,000倍+殺菌劑+殺蟲劑+微量元素，促進新梢成熟。
連續2-3次，間隔7～10天。
6. 謝花後，小果期，充分灌水，促進果實生長。
7. 5月中、下旬施追肥，促進果實發育。追肥以低氮高鉀之台肥2號或4號，視掛果量多寡施用。