

南投縣仁愛鄉布農族 武界部落食用植物多樣性

自然科學博物館副研究員 嚴新富



摘要

南投縣仁愛鄉布農族武界部落的食用植物田野調查，分別在 2011 及 2019 進行，其中在 2019 年間的訪談，是配合臺中區農業改良場所進行基本資料的調查。將所記錄到的野生植物建立名錄。再依據族人的概念，將食用植物分成傳統食用作物（含澱粉類、豆類、南瓜、根莖類）、蔬菜（含野菜類、外來的菜、救荒食物）、水果（含水果、堅果）及零嘴（分果實、葉片、地下部位）、茶飲與嗜好品、間接食用等五大類，每一種植物均會敘明中名、學名、科名及訪談內容。

田野調查

布農族武界部落的田野調查，分別在 2011 年 10 月 25-26 日及 2019 年 3 月 20 日、6 月 20 日及 10 月 5 日進入部落訪談；其中在 2019 年間的訪談，是配合行政院農業委員會臺中區農業改良場，所進行的植物資源基本資料的調查。野生植物調查及採集地點包括投 71 線過隧道往武界之潮濕山壁、武界至水庫大壩、武界林道 4.5K 前後、武界至一線天等地，所採集到的植物名錄如附件。

傳統作物的訪談以作物樣品進行，同時輔以作物的彩色圖鑑。至於野生植物的訪談，在耆老行動方便的前題下，到野外現地訪談。若耆老不方便到野外，則採集新鮮植物，回部落訪談。所訪談的植物樣品，會製成臘葉標本，編上作者的採集編號後，存放在國立自然科學博物館的標本館中，以供後人查閱。

食用植物分類

整理田野調查的資料後，依據族人的概念，將食用植物分成傳統食用作物、蔬菜、水果及零嘴、茶飲及嗜好品、間接食用等五大類，其他再細分各小類，每一種植物均會敘明中名、學名、科名及訪談內容，分別說明如下。

壹、傳統食用作物

一、澱粉類

1. 小米〔*Setaria italica* (L.) P. Beauv.〕禾本科 Gramineae (Poaceae)

小米的品種有：

- (1). miibar lulat (糯性) 糯性品種，可做小米酒。
- (2). malamaotiocu 穗分叉的品種是小粒的，煮飯吃，收穫時另選，送給頭目吃的。
- (3). miilab kasin (非糯性)，煮食。

小米的播種期在東方為 12 月，這裏是 1 月，而在部落為 2 月；通常在 6-7 月採收小米，而紅藜〔台灣藜 (*Chenopodium formosanum*) 卻要在年底才能採收。大白花咸豐草 (*Bidens pilosa* var. *radiata*) 是小米田很討厭的草。

種小米時，一塊地不能混種，一般糯性品種少量，而其他品種大量栽植。以前小米酒只有在祭典時用，糯小米也能做年糕，是祭典時的傳統食物；年糕以月桃 (*Alpinia zerumbet*) 葉包在外層，很香，很好吃。做小米酒時，小米打殼時只能打一半，酒會稀釋；全部打後燒熱水至滾，噴出，稍軟化後再打，以月桃葉包住，蒸，吃起來有小米的甜味，是以前無砂糖時代的替代品。

收成後的入倉祭 (malaline)，會用到年糕及酒當祭品，同時殺一條豬；小米需貼在倉庫兩邊，豬放在中間，在山上只有鄰居，大家齊聚在祭典中；唱入倉歌「祈求今天入倉的作物能很耐吃」；再分豬肉，首先由最年長的分頭部及下巴。

做小米酒的過程：小米先打好，浸泡水至稍酸化，煮；mukun (台灣藜，又稱紅藜) 先曬乾後打成粉末，加入，此粉末不能外洩；混合煮好的小米後，放入由挖

深的大木頭 (lakus) 製成的容器內，放涼；此時需依溫度決定，勿太熱，會變成醋，太冷則醱酵較慢；再入甕，一層小米，一層酵母粉 (紅藜粉末)。

在田裏小米會與紅藜 (台灣藜) 混種，小米較早成熟，而紅藜 (台灣藜) 較晚熟，但要一起播種。入倉時，其他族的人不能用小米灑在豬肉上，否則其他家族嫁出去的女兒不能吃它，這種灑小米的動作往往是非自主性。

玉米 (*Zea mays*) 打成粉，可加入小米稀飯，也可加入旱稻 (*Oryza sativa*) 稀飯中一起吃；大薯 (*Dioscorea alata*) 以小杵臼打成漿，配小米飯，拌著吃；收小米時，用蜘蛛抱蛋 [台灣蜘蛛抱蛋 (*Aspidistra elatior* var. *attenuata*)] 的葉片綁。

2. 穆子 [*Eleusine coracana* (L.) Gaertn.] 禾本科 Gramineae (Poaceae)

磨成粉，似玉米 (*Zea mays*) 粉食用；曬乾，裏面淡紅色；糯米 (*Oryza sativa*) 稀飯加穆子粉，很好吃；煮稀飯時可加穆子粉；今已無，翻譯者 16 歲時才無。也有族人將穆子加入米飯煮來吃。

3. 高粱 [*Sorghum bicolor* (L.) Moench] 禾本科 Gramineae (Poaceae)

主食之一，只有一品種；玉米 (*Zea mays*) 打了之後去殼，分大中小，大粒者與高粱一起煮；高粱去殼後，裏面是紅色的，煮熟後放二天，會變甜甜的；傳統食物 kabiyak，有點湯，會甜甜的，不能再加熱，否則會酸化。

4. 薏苡 [*Coix lacryma-jobi* L.] 禾本科 Gramineae (Poaceae)

有 2 種，一種可以吃，但打起來很麻煩，以前種在旱地，今已不種了。另一為野生種 [註：可能是念珠薏苡 (*Coix lacryma-jobi* var. *maxima*)]，不可食用，只當項鍊。

可週年播種，在田邊或畸零地均可播種，種一次後就不必管它，因小鳥會吃它的果實，而幫它傳播；或它的種子會自行掉落而萌芽生長，已經有野生化現象。

結果期在 8-10 月間，不結果時像草一樣。只有一種，在同一棵植株上，可以看到白色、黑色的果實，依生長程度不同而已。

將薪柴先燒成炭，在炭火中放入果實烤，會有 pipipopo 的聲音，硬殼會裂開，取出種子可以直接食用，或拿來與其他食物煮食，或磨成粉後再處理。現在很少人吃它。

果實串起來可當項鍊，或頭飾。

成串的果實掛在門口，可以避邪。

5. 玉米〔*Zea mays* L.〕禾本科 Gramineae (Poaceae)

以前只有一品種 *lauba*；今有白色品種 *lauba toklaz*、紅色品種 *lauba langac*，和混色品種。

玉米打成粉 (*dandan*)，可加入小米 (*Setaria italica*) 稀飯，也可加入旱稻 (*Oryza sativa*) 稀飯中一起吃；玉米打了之後去殼，分大中小，大粒者與高粱一起煮。

飼料玉米先曬乾，再泡水，打後再煮。也用來做酒。

6. 台灣藜 (俗稱紅藜)〔*Chenopodium formosanum* Koidz.〕藜科 Chenopodiaceae：

做酒用。

7. 陸稻 (旱稻)〔*Oryza sativa* L.〕禾本科 Gramineae (Poaceae)。

每天打米，當天吃。

米醬先煮後再發酵，發酵時會長毛毛的。

糯米蒸後再發酵，用來做酒釀。

8. 稷〔*Panicum miliaceum* L.〕禾本科 Gramineae (Poaceae)。

布農族傳統作物，但武界部落無訪談資料。

二、豆類及南瓜

1. 樹豆〔*Cajanus cajan* (L.) Millsp.〕 (木豆) 豆科 Leguminosae

1 月時播種，10 月底才開花，12 月採收；樹豆一年收一次，而芋頭 (*Colocasia esculenta*) 喜歡留在土中；有黑色 (cv. *galilan*) 及黃色品種，米黃色品種 (cv. *debula singi*) 由信義引進，目前以黑色品種為主。

2. 鵲豆〔*Lablab purpureus* (L.) Sweet〕 (肉豆、皇帝豆) 豆科 Leguminosae：

有白及紅 2 品種，不吃莢，主要吃種子，與山肉湯一起煮，今已不種植。

3. 萊豆〔*Phaseolus lunatus* L.〕 (皇帝豆) 豆科 Leguminosae：

很香，籽較小；今已無。

4. 米豆 (赤小豆)〔*Vigna umbellata* (Thunb.) Ohwi & Ohashi〕 豆科 Leguminosae：

花黃色，十月底開花，豆有紅、綠二類，子葉不出土。



6 月以前種，10-11 月開花。

乾豆用來煮湯。

5. 豇豆〔*Vigna unguiculata* (L.) Walp.〕(八月豆) 豆科 Leguminosae：

白皮的品種今已無人種植；紅皮的較短，也是古老品種，連皮一起吃，今馬老師還有種植；老人家生病時會想念傳統的豇豆，此時會煮湯給他吃。

6. 大豆(黃豆)〔*Glycine max* (L.) Merr.〕豆科 Leguminosae：

吃乾豆。

7. 南瓜〔*Cucurbita moschata* Duchesne ex Poir.〕葫蘆科 Cucurbitaceae：

以前的大型種，外形分圓形及橢圓形，一粒南瓜大到一個小學六年級學生背不動，今已無古老的品種。

南瓜大小；外來的品種需加引進者人名，如 Hudan + 人名。

傳統上會摘心以促進分枝，所摘下的嫩芽傳統上當菜吃；摘心要在未開花前施行，開花後摘心就不會長。

南瓜通常與地瓜〔甘藷(*Ipomoea batatas*)〕一起煮，一層地瓜，一層南瓜，層層相疊。

三、根莖類：

1. 芋〔*Colocasia esculenta* (L.) Schott〕天南星科 Araceae：

品種有：1. day gucngog 報導人喜食，平地種較多，今變較大形，肉紫紅色；2. day laubas；3. day bokbok；4. day gabilat 報導人喜食，糯性品種，帶黃色，粘粘的。

樹豆〔木豆(*Cajanus cajan*)〕一年收一次，而芋頭喜歡留在土中。

2. 大薯〔*Dioscorea alata* L.〕薯蕷科 Dioscoreaceae：

有紫色的，掃巴型的品種。

可煮湯，或磨漿吃；大薯以小杵臼打成漿，配小米(*Setaria italica*)飯，拌著吃。

3. 甘藷(地瓜)〔*Ipomoea batatas* (L.) Lam.〕旋花科 Convolvulaceae：

甘藷有很多品種，如 dakuanung 是古老品種，心葉紫色，白皮白肉，長形，肉質鬆鬆的；hudangihong 水分較多，紅皮白肉，圓形。

地瓜(甘藷)可煮成泥狀，或加粉食用。

4. 千年芋〔*Xanthosoma sagittifolium* (L.) Schott〕天南星科 Araceae：

傳統的作物，白色（註：應為淺綠色）的葉片，吃子芋，不吃葉柄。

5. 山葛〔*Pueraria montana* (Lour.) Merr.〕豆科 Leguminosae：

挖地下塊根可以吃；根也可以烤食。

貳、蔬菜

一、野菜類

1. 瓦氏鳳尾蕨〔*Pteris wallichiana* Ag.〕鳳尾蕨科 Pteridaceae：

可食，吃起來粘粘的；以火灰泡 2 天，再以鹽巴醃 1 天，洗乾淨後煮湯或炒食。

2. 構樹〔*Broussonetia papyrifera* (L.) L'Herit. ex Vent.〕桑科 Moraceae：

嫩芽當菜，去會苦的托葉後，川燙後再炒，或炸；現代拿來做甜不辣。

3. 小葉桑〔*Morus australis* Poir.〕桑科 Moraceae：

嫩芽當菜。

4. 山豬肉〔*Meliosma rhoifolia* Maxim.〕清風藤科 Sabiaceae：

三、四月採嫩葉吃，燙後加花生（*Arachis hypogea*）粉一起吃；今族人用來炒食。

山豬肉嫩心加花生或花生粉，與蒜頭（*Allium tuberosa*）一起炒香可食。四、五月採嫩芽。

5. 溪頭秋海棠〔*Begonia chitoensis* Liu & Lai〕秋海棠科 Begoniaceae：

今當風味餐，涼拌或煮酸辣湯。

6. 水芹菜〔*Oenanthe javanica* (Bl.) DC.〕繖形科 Umbelliferae：

加肉絲炒菜（51）。

7. 鵝仔菜〔*Pterocypsela indica* (L.) C. Shih〕菊科 Compositae：

鵝仔菜可以當菜吃。客人來訪時，用鵝仔菜加花生（*Arachis hypogea*）粉當菜。

8. 台灣油點草〔*Tricyrtis formosana* Baker〕百合科 Liliaceae：

嫩梢用來炒豬肉。

9. 五節芒〔*Miscanthus floridulus* (Labill.) Warb. ex K. Schum. & Lauterb.〕禾本科 Gramineae (Poaceae)：

嫩筍可食，當菜。

10. 山棕〔*Arenga tremula* (Blanco) Becc.〕棕櫚科 Palmae：

嫩心水煮後當菜（32）；心可煮食，或與山肉一起煮。

11. 黃藤〔*Calamus quiquetinervius* Burret〕棕櫚科 Palmae：

藤心當菜。

12. 隼人瓜（梨瓜、佛手瓜）〔*Sechium edule* Sw.〕葫蘆科 Cucurbitaceae：

傳統吃法是吃嫩瓜及削皮的老瓜，但不吃種子。

吃嫩芽是現代的用法。

13. 其他野菜：

其他嫩芽或嫩葉可食的野菜尚包括桫欏科（Cyatheaceae）的筆筒樹〔*Cyathea lepifera* (J. Sm. ex Hook.) Copel.〕、蹄蓋蕨科（Athyriaceae）的過溝菜蕨〔*Diplazium esculentum* (Retz.) Sw.〕、蓼科（Polygonaceae）的火炭母草〔*Polygonum chinense* L.〕、胡椒科（Piperaceae）的薄葉風藤〔*Piper sintenense* Hatusima〕、十字花科（Cruciferae）的葶藶（山芥菜）〔*Rorippa indica* (L.) Hiern〕、茄科（Solanaceae）的白英〔*Solanum lyratum* Thunb.〕、菊科（Compositae）的苦苣菜〔*Sonchus arvensis* L.〕、苦蕒菜〔*Sonchus oleraceus* L.〕。

二、外來的（非傳統使用的）菜

1. 虎刺櫛木〔*Aralia armata* (Wall.) Seem.〕五加科 Araliaceae：

日本人喜食。春天嫩芽可當菜吃。

2. 昭和草〔*Crassocephalum crepidioides* (Benth.) S. Moore〕菊科 Compositae：

當菜，可煮湯或炒食，嫩稍炒蛋。

3. 飛機草〔*Erechtites valerianifolia* (Wolf ex Rchb.) DC.〕菊科 Compositae：

老人家常吃的菜；有一則故事：日本人用飛機灑種子，有一個人叫 Lammu 死後在他的墳墓上此草長得特別茂盛，老人家拿來吃吃看，才變成我們的菜。

飛機草水煮後加花生（*Arachis hypogea*）粉吃。

4. 紅茄〔*Solanum integrifolium* Poir.〕茄科 Solanaceae：

很重要的菜，果實可以當菜，紅果、綠果都可以吃，但很苦。有客人來時煮的菜。

日本人帶入部落，吃起來苦苦的。紅果及綠果均水煮後可吃，或與山肉一起吃。

5. 台灣山蘇花〔*Asplenium nidus* L.〕鐵角蕨科 Aspleniaceae：

有族人當菜吃；但也有族人認為以前不吃，今當菜，是向阿美族學習的。

〔筆者註：阿美族人吃的「山蘇花」，在植物學上稱為南洋山蘇花（*Asplenium*

australasicum)，外形很像台灣山蘇花，但葉背中肋有一凸起的稜線，因此常被誤認]

5. 假酸漿〔*Trichodesma khasianum* Clarke〕紫草科 Boraginaceae：

排灣族及魯凱族人取葉片包 chinapu (註：傳統食物，可以連包葉一起吃，對布農族而言，屬外來知識)。

6. 天仙果〔*Ficus formosana* Maxim.〕桑科 Moraceae：

族人最近才用來煮雞湯。

7. 小葉桑 (小桑樹)〔*Morus australis* Poir.〕桑科 Moraceae：

最近族人取嫩梢炸食 (註：外來知識)。

三、救荒食物

1. 筆筒樹〔*Cyathea lepifera* (J. Sm. ex Hook.) Copel.〕桫欏科 Cyatheaceae：

光復時飢荒，吃它的心；但也有族人不吃。

2. 台灣青芋 (山芋)〔*Colocasia formosana* Hayata〕天南星科 Araceae：

葉片及芋頭煮後，用來餵豬。久煮後人才可以吃。

也有布農族其他部落的族人認為它是救荒野菜，葉柄、塊根煮食。

3. 廣葉鋸齒雙蓋蕨〔*Diplazium dilatatum* Bl.〕蹄蓋蕨科 Athyriaceae：

布農族人會吃，但武界部落有族人不吃。

參、水果及零嘴

一、水果

1. 茅瓜〔*Solena amplexicaulis* (Lam.) Gandhi〕葫蘆科 Cucurbitaceae：

果可食，味甜。

但也有族人認為吃嫩芽是現代的用法。

2. 其他水果：

其他當水果吃的植物尚有桑科 (Moraceae) 的愛玉子〔*Ficus pumila* L. var. *awkeotsang* (Makino) Corner〕、小葉桑〔*Morus australis* Poir.〕、木通科 (Ladizabalaceae) 的長序木通〔*Akebia longeracemosa* Matsum.〕、石月〔*Stauntonia obovatifoliola* Hayata〕、獼猴桃科 (Actinidiaceae) 的水冬瓜〔*Saurauia tristyla* DC. var. *oldhamii* (Hemsl.) Finet & Gagnep.〕、薔薇科 (Rosaceae) 的台灣懸鉤子

〔*Rubus formosensis* Ktze.〕，但也有部分武界部落族人不吃台灣懸鉤子的果實。

二、堅果：

1. 野核桃（台灣胡桃）〔*Juglans cathayensis* Dode〕胡桃科 Juglandaceae：
果烤後打碎，吃仁，好吃，很香。
2. 油葉石櫟（小西氏石櫟）〔*Pasania konishii* (Hayata) Schottky〕殼斗科 Fagaceae：
果烤後打碎，吃起來像花生。
3. 族人不吃的堅果：
青剛櫟〔*Cyclobalanopsis glauca* (Thunb. ex Murray) Oerst.〕殼斗科 Fagaceae：
因果實太苦，族人不吃。

三、零嘴（依食用部位分）：

（一）果實：

1. 小構樹〔*Broussonetia kazinoki* Sieb.〕桑科 Moraceae：
果可食，但吃時會粘舌頭。
2. 柘樹（刺格）〔*Maclura cochinchinensis* (Lour.) Corner〕桑科 Moraceae：
果可食，吃起來酸酸的。
3. 羅氏鹽膚木〔*Rhus javanica* L. var. *roxburghiana* (DC.) Rehd. & Willson〕漆樹科 Anacardiaceae：
果實表面會長白色的鹽巴，可食，但人少吃，因又鹹又酸。
4. 山紅柿〔*Diospyros morrisiana* Hance〕柿樹科 Ebenaceae：
果實族人少吃，因味道澀澀的。
5. 俄氏柿〔*Diospyros oldhamii* Maxim.〕柿樹科 Ebenaceae：
果可食。但也有族人認為果雖可食，但很澀。
6. 紅籽莢蒾〔*Viburnum formosanum* Hayata〕忍冬科 Caprifoliaceae：
果可食，吃起來酸酸甜甜且帶點苦味。
7. 刺茄〔*Solanum capsicoides*〕茄科 Solanaceae：
果可食，族人只吃內果皮。
8. 三角葉西番蓮（黑果西番蓮）〔*Passiflora suberosa* Linn.〕西番蓮科 Passifloraceae
果可食，但也有族人認為果不可食。

9. 其他零嘴：

其他果實可當零嘴吃的尚有桑科 (Moraceae) 的構樹〔*Broussonetia papyrifera* (L.) L'Herit. ex Vent.〕、越橘葉蔓榕〔*Ficus vaccinioides* Hemsl. ex King〕、小葉桑〔*Morus australis* Poir.〕，以及蓼科 (Polygonaceae) 的火炭母草〔*Polygonum chinense* L.〕。

(二) 葉片：

1. 酢漿草〔*Oxalis corniculata* L.〕酢漿草科 Oxalidaceae：

當零嘴吃，吃起來酸酸的。

2. 溪頭秋海棠〔*Begonia chitoensis* Liu & Lai〕秋海棠科 Begoniaceae：

當零嘴吃，比較甜。也有族人認為溪頭秋海棠的葉柄及腎蕨 (*Nephrolepis auriculata*) 的球莖可止渴。

3. 酸藤〔*Ecdysanthera rosea* Hook. & Arn.〕茄科 Solanaceae：

武界布農族人不吃，但泰雅族人會吃。

(三) 花：

1. 南澳杜鵑 (埔里杜鵑)〔*Rhododendron breviperulatum* Hayata〕杜鵑花科 Ericaceae：

五、六月開花，族人會吃花。

2. 金毛杜鵑〔*Rhododendron oldhamii* Maxim.〕杜鵑花科 Ericaceae：

花可食，花瓣吃起來吃起來酸酸的，族人也會吃花蜜。

(三) 地下部位：

1. 腎蕨〔*Nephrolepis auriculata* (L.) Trimen〕蓴蕨科 Oleandraceae：

球莖可食，用來解渴。

2. 台灣蜘蛛抱蛋的蛋 (註：塊根)〔*Aspidistra elatior* Blume var. *attenuata* (Hayata) S. S. Ying〕百合科 Liliaceae

塊根可以生吃，吃起來有甜味。

(四) 布農族人有吃，但武界部落族人不吃果實者：

1. 水麻〔*Debregeasia orientalis* C. J. Chen〕蕁麻科 Urticaceae：

布農族人會吃果實，武界部落族人不吃果實。

2. 長梗紫麻〔*Oreocnide pedunculata* (Shirai) Masam.〕蕁麻科 Urticaceae：

布農族人會吃果實，但武界部落族人認為果不可食。

肆、茶飲及嗜好品

一、煮來當茶水喝：

1. 天仙果〔*Ficus formosana* Maxim.〕桑科 Moraceae：
加入開水煮來喝。
2. 小葉桑〔*Morus australis* Poir.〕桑科 Moraceae：
嫩梢可煮來當茶喝。
3. 戟菜（魚腥草）〔*Houttuynia cordata* Thunb.〕三白草科 Saururaceae：
煮水喝。
4. 水芹菜〔*Oenanthe javanica* (Bl.) DC.〕繖形科 Umbelliferae (Apiaceae)：
煮來當茶喝。
5. 刀傷草〔*Ixeridium laevigatum* (Blume) J. H. Pak & Kawano〕菊科 Compositae (Asteraceae)：
煮水喝。
6. 鵝仔菜〔*Pterocypsela indica* (L.) C. Shih〕菊科 Compositae (Asteraceae)：
煮湯當飲料，放入冰箱。
7. 苦苣菜〔*Sonchus arvensis* L.〕菊科 Compositae (Asteraceae)：
煮水喝。煮水喝，特別苦。煮水後當茶。煮來當茶水喝。
8. 複方：
族人用菊科 Compositae (Asteraceae) 的兔仔菜〔*Ixeris chinensis* (Thunb.) Nakai〕、sama（苦苣菜、鵝仔菜），以及茄科 (Solanaceae) 的光果龍葵〔*Solanum americanum* Miller〕、kolut（註：物種待確定）等一起煮水當茶喝。

二、嗜好品：

1. 薄葉艾納香〔*Blumea aromatica* DC.〕菊科 Compositae (Asteraceae)：
以前當香菸。

伍、間接食用

1. 九芎〔*Lagerstroemia subcostata* Koehne〕千屈菜科 Lythraceae：

上面有螞蟻大便（註：應為蚜蟲分泌的蜜汁），甜甜的，可食。

2. 海州常山〔*Clerodendrum trichotomum* Thunb.〕馬鞭草科 Verbenaceae：

幹內會長蟲（sasanal），可烤食。

枝幹會長蟲（suswun），族人會抓來吃。

3. 五節芒〔*Miscanthus floridulus* (Labill.) Warb. ex K. Schum. & Lauterb.〕禾本科 Gramineae (Poaceae)

稈基部會長蟲癭（具族語，但忘記），其蛹 (ova) 可食，用來解渴。

附錄 布農族武界部落田野調查植物名錄 (含傳統栽培作物)

學名	中名
蕨類植物	
卷柏科 Selaginellaceae	
<i>Selaginella delicatula</i> (Desv.) Alston	全緣卷柏
<i>Selaginella moellendorffii</i> Hieron.	異葉卷柏
<i>Selaginella remotifolia</i> Spring	疏葉卷柏
<i>Selaginella repanda</i> (Desv. ex Poir) Spring	高雄卷柏
<i>Selaginella tamariscina</i> (Beauv.) Spring	萬年松
木賊科 Equisetaceae	
<i>Equisetum ramosissimum</i> Desf. subsp. <i>ramosissimum</i>	木賊
觀音座蓮舅科 Marattiaceae	
<i>Angiopteris lygodiiifolia</i> Rosenst.	觀音座蓮
莎草蕨科 Schizaeaceae	
<i>Lygodium japonicum</i> (Thunb.) Sw.	海金沙
裏白科 Gleicheniaceae	
<i>Dicranopteris linearis</i> (Burm. f.) Underw.	芒萁
蚌殼蕨科 Dicksoniaceae	
<i>Cibotium taiwanianum</i> Kuo	台灣金狗毛蕨
杪羅科 Cyatheaceae	
<i>Cyathea lepifera</i> (J. Sm.) Copel	筆筒樹
<i>Cyathea spinulosa</i> Wall. ex Hook.	台灣杪羅
碗蕨科 Dennstaedtiaceae	
<i>Dennstaedtia scandens</i> (Bl.) Moore	刺柄碗蕨
<i>Microlepia marginata</i> (Panzer) Chr.	邊緣鱗蓋蕨
<i>Microlepia strigosa</i> (Thunb.) Presl	粗毛鱗蓋蕨
<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn subsp. <i>wightianum</i> (Wall.) Shieh	巒大蕨
鱗始蕨科 Lindsaeaceae	
<i>Lindsaea orbiculata</i> (Lam.) Mett. ex Kuhn var. <i>commixta</i> (Tagawa) Shieh	海島鱗始蕨
<i>Sphenomeris chusana</i> (L.) Copel.	烏蕨
鳳尾蕨科 Pteridaceae	
<i>Cheilanthes dealbata</i> D. Don.	台灣粉背蕨
<i>Cheilanthes karmeri</i> Franch	克氏粉背蕨

學名	中文名
<i>Cheilanthes mysuriensis</i> Wall.	細葉碎米蕨
<i>Cheilanthes</i> sp.	碎米蕨屬
<i>Onychium japonicum</i> (Thunb.) Kunze	日本金粉蕨
<i>Pteris biaurita</i> L.	弧脈鳳尾蕨
<i>Pteris dispar</i> Kunze	天草鳳尾蕨
<i>Pteris ensiformis</i> Burm.	箭葉鳳尾蕨
<i>Pteris formosana</i> Bak.	台灣鳳尾蕨
<i>Pteris longipes</i> Don	蓬萊鳳尾蕨
<i>Pteris longipinna</i> Hayata	長葉鳳尾蕨
<i>Pteris semipinnata</i> L.	半邊羽裂鳳尾蕨
<i>Pteris vittata</i> L.	鱗蓋鳳尾蕨
<i>Pteris wallichiana</i> Ag.	瓦氏鳳尾蕨
鐵線蕨科 Adiantaceae	
<i>Adiantum edgeworthii</i> Hook.	愛氏鐵線蕨
<i>Adiantum malesianum</i> Ghatak	馬來鐵線蕨
<i>Adiantum philippense</i> L.	半月形鐵線蕨
書帶蕨科 Vittariaceae	
<i>Vittaria anguste-elongata</i> Hayata	姬書帶蕨
水龍骨科 Polypodiaceae	
<i>Colysis elliptica</i> (Thunb.) Ching	橢圓線蕨
<i>Colysis wrightii</i> (Hook.) Ching	萊氏腺蕨
<i>Lemmaphyllum microphyllum</i> Presl	伏石蕨
<i>Lepisorus obscurevenulosus</i> (Hyaata) Ching	奧瓦蕨
<i>Microsorium fortunei</i> (Moore) Ching	大星蕨
<i>Pseudodrynaria coronans</i> (Wall.) Ching	崖薑蕨
金星蕨科 Thelypteridaceae	
<i>Cyclosorus acuminatus</i> (Houtt.) Nakai ex H. Ito	小毛蕨
<i>Cyclosorus parasiticus</i> (L.) Farw.	密毛小毛蕨
<i>Cyclosorus truncatus</i> (Poir.) Farw.	大葉毛蕨
<i>Glaphyopteridopsis erubescens</i> (Hook.) Ching	方桿蕨
<i>Phegopteris decursive-pinnata</i> (van Hall) Fée	短柄卵果蕨
<i>Pseudocyclosorus esquirolii</i> (Christ) Ching	假毛蕨
鐵角蕨科 Aspleniaceae	
<i>Asplenium adiantoides</i> (L.) C. Chr.	革葉鐵角蕨

學名	中文名
<i>Asplenium cheilosorum</i> Kunze ex Mett.	薄葉孔雀鐵角蕨
<i>Asplenium ritoense</i> Hayata	尖葉鐵角蕨
<i>Asplenium nidus</i> L.	台灣山蘇花
烏毛蕨科 Blechnaceae	
<i>Blechnum orientale</i> L.	烏毛蕨
<i>Woodwardia orientalis</i> Sw. var. <i>formosana</i> Rosenst.	台灣狗脊蕨
骨碎補科 Davalliaceae	
<i>Davallia formosana</i> Hayata	大葉骨碎補
篠蕨科 Oleandraceae	
<i>Arthropteris palisotii</i> (Desv.) Alston	藤蕨
<i>Nephrolepis auriculata</i> (L.) Trimen	腎蕨
<i>Nephrolepis multiflora</i> (Roxburgh) Jarrett et Morton	毛葉腎蕨
鱗毛蕨科 Dryopteridaceae	
<i>Arachniodes aristata</i> (Forst.) Tindle	細葉複葉耳蕨
<i>Arachniodes rhomboides</i> (Wall.) Ching	斜方複葉耳蕨
<i>Arachniodes</i> sp.	複葉耳蕨屬
<i>Dryopteris formosana</i> (Christ) C. Chr.	台灣鱗毛蕨
<i>Dryopteris scottii</i> (Beddome) Ching	史氏鱗毛蕨
<i>Dryopteris</i> sp.	鱗毛蕨屬
三叉蕨科 Aspidiaceae	
<i>Hypodematium crenatum</i> (Forsk.) Kuhn	腫足蕨
<i>Tectaria coadunata</i> (Wall.) C. Chr.	觀音三叉蕨
<i>Tectaria polymorpha</i> (Wall.) Copel.	南投三叉蕨
蹄蓋蕨科 Athyriaceae	
<i>Deparia petersenii</i> (Kunze) M. Kato	假蹄蓋蕨
<i>Diplazium dilatatum</i> Blume	廣葉鋸齒雙蓋蕨
被子植物 -- 雙子葉	
胡桃科 Juglandaceae	
<i>Juglans cathayensis</i> Dode	台灣胡桃
殼斗科 Fagaceae	
<i>Cyclobalanopsis glauca</i> (Thunb. ex Murray) Oerst.	青剛櫟
<i>Pasania kawakamii</i> (Hayata) Schottky	大葉石櫟
<i>Pasania konishii</i> (Hayata) Schottky	油葉柯

學名	中名
榆科 Ulmaceae	
<i>Aphananthe aspera</i> (Thunb. ex Murray) Planch.	糙葉樹
<i>Celtis formosana</i> Hayata	石朴
<i>Trema orientalis</i> (L.) Blume	山黃麻
<i>Trema tomentosa</i> (Roxb.) Hara	山油麻
<i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino	欖
桑科 Moraceae	
<i>Broussonetia kazinoki</i> Sieb.	小構樹
<i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) L'Herit. ex Vent.	構樹
<i>Fatoua pilosa</i> Gaud.	細齒水蛇麻
<i>Ficus erecta</i> Thunb. var. <i>beecheana</i> (Hook. & Arn.) King	牛奶榕
<i>Ficus formosana</i> Maxim.	台灣天仙果
<i>Ficus pumila</i> L. var. <i>awkeotsang</i> (Makino) Corner	愛玉子
<i>Ficus sarmentosa</i> B. Ham. ex J. E. Sm. var. <i>nipponica</i> (Fr. & Sav.) Corner	珍珠蓮
<i>Maclura cochinchinensis</i> (Lour.) Corner	柘樹
<i>Morus australis</i> Poir.	小葉桑
蕁麻科 Urticaceae	
<i>Boehmeria densiflora</i> Hook. & Arn.	密花苧麻、木苧麻
<i>Boehmeria nivea</i> (L.) Gaud.	苧麻
<i>Boehmeria nivea</i> (L.) Gaudich var. <i>tenacissima</i> (Gaudich.) Miq	青苧麻、山苧麻
<i>Boehmeria pilosiuscula</i> (Bl.) Hassk.	華南苧麻
<i>Boehmeria pilushanensis</i> Liu & Lu	畢祿山苧麻
<i>Boehmeria wattersii</i> (Hance) Shih & Yang	長葉苧麻
<i>Debregeasia orientalis</i> C. J. Chen	水麻
<i>Elatostema herbaceifolium</i> Hayata	台灣樓梯草
<i>Elatostema lineolatum</i> Wight var. <i>majus</i> Wedd.	冷清草
<i>Elatostema</i> sp.	樓梯草屬
<i>Gonostegia hirta</i> (Bl.) Miq.	糯米團
<i>Gonostegia matsudai</i> (Yamamoto) Yamamoto & Masam.	小葉石薯
<i>Nanocnide japonica</i> Bl.	花點草
<i>Oreocnide pedunculata</i> (Shirai) Masam.	長梗紫麻
<i>Pilea funkikensis</i> Hayata	奮起湖冷水麻
<i>Pilea melastomoides</i> (Poir.) Wedd.	大冷水麻
<i>Pilea microphylla</i> (L.) Liebm.	小葉冷水麻

學名	中文名
<i>Pilea peplodes</i> (Gaudich.) Hook. & Arn. var. <i>peplodes</i>	矮冷水麻
<i>Pilea plataniflora</i> C. H. Wright	西南冷水麻
<i>Pilea rotundinucula</i> Hayata	圓果冷水麻
<i>Pilea</i> sp.	冷水麻屬
<i>Procris laevigata</i> Bl.	烏來麻
山龍眼科 Proteaceae	
<i>Helicia formosana</i> Hemsl.	山龍眼
蓼科 Polygonaceae	
<i>Polygonum chinense</i> L.	火炭母草
<i>Polygonum multiflorum</i> Thunb. ex Murray var. <i>hypoleucum</i> (Ohwi) Liu, Ying & Lai	台灣何首烏
石竹科 Caryophyllaceae	
<i>Drymaria diandra</i> Bl.	菁芳草
<i>Stellaria aquatica</i> (L.) Scop.	鵝兒腸
藜科 Chenopodiaceae	
<i>Chenopodium formosanum</i> Koidz.	台灣藜
莧科 Amaranthaceae	
<i>Achyranthes bidentata</i> Bl.	牛膝
<i>Celosia argentea</i> L.	青葙
樟科 Lauraceae	
<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) Presl.	樟
<i>Cinnamomum osmophloeum</i> Kanehira	土肉桂
<i>Lindera communis</i> Hemsl.	香葉樹
<i>Litsea acuminata</i> (Blume) Kurata	長葉木薑子
<i>Litsea hypophaea</i> Hayata	黃肉樹
<i>Neolitsea konishii</i> (Hayata) Kanehira & Sasaki	五掌楠
毛茛科 Ranunculaceae	
<i>Clematis parviloba</i> Gard. ex Champ. subsp. <i>bartlettii</i> (Yamamoto) Yang & Huang	巴氏鐵線蓮
<i>Clematis tashiroi</i> Maxim.	田代氏鐵線蕨
<i>Clematis uncinata</i> Champ. ex Benth.	柱果鐵線蓮
<i>Ranunculus cantoniensis</i> DC.	禺毛茛
木通科 Lardizabalaceae	
<i>Akebia longeracemosa</i> Matsum.	長序木通

學名	中名
<i>Stauntonia obovatifoliola</i> Hayata	石月
防已科 Menispermaceae	
<i>Stephania japonica</i> (Thunb. ex Murray) Miers	千金藤
三白草科 Saururaceae	
<i>Houttuynia cordata</i> Thunb.	臭腥草
胡椒科 Piperaceae	
<i>Peperomia sui</i> Lin & Lu	紅莖椒草
<i>Piper kadsura</i> (Choisy) Ohwi	風藤
<i>Piper sintenense</i> Hatusima	薄葉風藤
金粟蘭科 Chloranthaceae	
<i>Chloranthus oldhami</i> Solms.	四葉蓮 (台灣及己)
獼猴桃科 Actinidiaceae	
<i>Saurauia tristyla</i> DC. var. <i>oldhamii</i> (Hemsl.) Finet & Gagnep.	水冬瓜
茶科 Theaceae	
<i>Adinandra formosana</i> Hayata var. <i>formosana</i>	台灣楊桐
<i>Gordonia axillaris</i> (Roxb.) Dietr.	大頭茶
山柑科 Capparaceae	
<i>Capparis acutifolia</i> Sweet	銳葉山柑
十字花科 Cruciferae (Brassicaceae)	
<i>Rorippa indica</i> (L.) Hiern	山芥菜、葶藶
金縷梅科 Hamamelidaceae	
<i>Liquidambar formosana</i> Hance	楓香
景天科 Crassulaceae	
<i>Kalanchoe spathulata</i> (Poir.) DC.	倒吊蓮
虎耳草科 Saxifragaceae	
<i>Astilbe longicarpa</i> (Hayata) Hayata	落新婦
<i>Deutzia pulchra</i> Vidal	大葉溲疏
海桐科 Pittosporaceae	
<i>Pittosporum illicioides</i> Makino	疏果海桐
薔薇科 Rosaceae	
<i>Duchesnea indica</i> (Andr.) Focke	蛇莓
<i>Prunus campanulata</i> Maxim.	山櫻花
<i>Rubus formosensis</i> Ktze.	台灣懸鉤子
<i>Spiraea prunifolia</i> Sieb. & Zucc. var. <i>pseudoprunifolia</i> (Hayata) Li	笑靨花

學名	中名
豆科 Leguminosae (Fabaceae)	
* <i>Arachis hypogea</i> L.	花生
<i>Bauhinia championii</i> (Benth.) Benth.	菊花木
* <i>Cajanus cajan</i> (L.) Millsp.	樹豆
<i>Derris laxiflora</i> Benth.	疏花魚藤
<i>Desmodium heterophyllum</i> (Willd.) DC.	變葉山螞蝗
<i>Dumasia villosa</i> DC. subsp. <i>bicolor</i> (Hayata) Ohashi & Tateishi	二色山黑扁豆
* <i>Glycine max</i> (L.) Merr.	大豆 (枝豆)
* <i>Lablab purpureus</i> (L.) Sweet	皇帝豆 (菜豆)
<i>Millettia reticulata</i> Benth.	老荊藤
<i>Mucuna macrocarpa</i> Wall.	血藤
* <i>Phaseolus lunatus</i> L.	菜豆
<i>Pueraria montana</i> (Lour.) Merr.	山葛
* <i>Vigna umbellata</i> (Thunb.) Ohwi & Ohashi	赤小豆 (米豆)
* <i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp.	八月豆 (豇豆)
酢漿草科 Oxalidaceae	
<i>Oxalis corniculata</i> L.	酢漿草
# <i>Oxalis corymbosa</i> DC.	紫花酢漿草
大戟科 Euphorbiaceae	
<i>Breynia officinalis</i> Hemsley	紅仔珠
<i>Bridelia tomentosa</i> Blume	土密樹
<i>Chamaesyce hirta</i> (L.) Millsp.	乳仔草
<i>Glochidion rubrum</i> Bl.	細葉饅頭果
<i>Mallotus japonicus</i> (Thunb.) Muell.-Arg.	野桐
<i>Mallotus paniculatus</i> (Lam.) Muell.-Arg.	白匏仔
* <i>Manihot esculenta</i> Crantz.	樹薯
<i>Sapium discolor</i> Muell.-Arg.	山白
楝科 Meliaceae	
<i>Melia azedarach</i> Linn.	苦楝
黃耨花科 Malpighiaceae	
<i>Hiptage benghalensis</i> (L.) Kurz.	猿尾藤
漆樹科 Anacardiaceae	
<i>Rhus javanica</i> L. var. <i>roxburghiana</i> (DC.) Rehd. & Willson	羅氏鹽膚木
<i>Rhus succedanea</i> L.	山漆

學名	中名
楓樹科 (槭樹科) Aceraceae	
<i>Acer albopurpurascens</i> Hayata	樟葉楓
<i>Acer serrulatum</i> Hayata	青楓
無患子科 Sapindaceae	
<i>Dodonaea viscosa</i> (L.) Jacq.	車桑子
<i>Sapindus mukorossii</i> Gaertn.	無患子
清風藤科 Sabiaceae	
<i>Meliosma rhoifolia</i> Maxim.	山豬肉
冬青科 Aquifoliaceae	
<i>Ilex asprella</i> (Hook. & Arn.) Champ.	燈稱花
衛矛科 Celastraceae	
<i>Euonymus laxiflorus</i> Champ. ex Benth.	大疔癩
省沽油科 Staphyleaceae	
<i>Turpinia formosana</i> Nakai	台灣山香圓
鼠李科 Rhamnaceae	
<i>Rhamnus formosana</i> Matsum.	桶鈎藤 (台灣鼠李)
<i>Sageretia thea</i> (Osbeck) Johnst.	雀梅藤
<i>Ventilago elegans</i> Hemsl.	翼核木
葡萄科 Vitaceae	
<i>Ampelopsis brevipedunculata</i> (Maxim.) Traut. var. <i>hancei</i> (Planch.) Rehder	漢氏山葡萄
<i>Parthenocissus tricuspidata</i> (Sieb. & Zucc.) Planch.	爬牆虎
<i>Tetrastigma umbellatum</i> (Hemsl.) Nakai	台灣崖爬藤
杜英科 Elaeocarpaceae	
<i>Elaeocarpus japonicus</i> Sieb. & Zucc.	薯豆
田麻科 Tiliaceae	
<i>Triumfetta bartramia</i> L.	垂椏草
錦葵科 Malvaceae	
<i>Hibiscus taiwanensis</i> Hu	山芙蓉
<i>Sida acuta</i> Burm. f.	細葉金午時花
<i>Sida rhombifolia</i> L. subsp. <i>rhombifolia</i>	金午時花
<i>Urena lobata</i> L.	野棉花
瑞香科 Thymelaeaceae	
<i>Wikstroemia indica</i> (L.) C. A. Mey.	南嶺蕘花

學名	中名
大風子科 Flacourtiaceae	
<i>Casearia membranacea</i> Hance	薄葉嘉賜木
西番蓮科 Passifloraceae	
# <i>Passiflora edulis</i> Sims.	百香果
# <i>Passiflora suberosa</i> Linn.	三角葉西番蓮
旌節花科 Stachyuraceae	
<i>Stachyurus himalaicus</i> Hook.f. & Thomson ex Benth.	通條樹
秋海棠科 Begoniaceae	
<i>Begonia aptera</i> Bl.	圓果秋海棠
<i>Begonia chitoensis</i> Liu & Lai	溪頭秋海棠
<i>Begonia laciniata</i> Roxb.	裂葉秋海棠
<i>Begonia ravenii</i> Peng & Chen	岩生秋海棠
葫蘆科 Cucurbitaceae	
* <i>Cucurbita moschata</i> Duchesne	南瓜
* <i>Sechium edule</i> Sw.	佛手瓜 (隼人瓜)
<i>Solena amplexicaulis</i> (Lam.) Gandhi	茅瓜
<i>Zehneria japonica</i> (Thunb.) H.-Y. Liu	馬兜兒
千屈菜科 Lythraceae	
# <i>Cuphea cartagenesis</i> (Jacq.) Macbrids	克菲亞草
<i>Lagerstroemia subcostata</i> Koehne	九芎
桃金娘科 Myrtaceae	
<i>Syzygium buxifolium</i> Hook. & Arn.	小葉赤楠
<i>Syzygium formosanum</i> (Hayata) Mori	台灣赤楠
八角楓科 Alangiaceae	
<i>Alangium chinense</i> (Lour.) Rehder	華八角楓
五加科 Araliaceae	
<i>Aralia armata</i> (Wall.) Seem.	虎刺刺穗
<i>Schefflera octophylla</i> (Lour.) Harms	江某 (鵝掌柴)
繖形科 Umbelliferae (Apiaceae)	
<i>Hydrocotyle nepalensis</i> Hook.	乞食碗
<i>Hydrocotyle sibthorpioides</i> Lam.	天胡荽
<i>Oenanthe javanica</i> (Bl.) DC.	水芹菜
杜鵑花科 Ericaceae	
<i>Rhododendron lasiostylum</i> Hayata	埔里杜鵑

學名	中名
<i>Rhododendron oldhamii</i> Maxim.	金毛杜鵑
紫金牛科 Myrsinaceae	
<i>Ardisia sieboldii</i> Miq.	樹杞
<i>Ardisia virens</i> Kurz.	黑星紫金牛
<i>Maesa perlaria</i> (Lour.) Merr. var. <i>formosana</i> (Mez) Yuen P. Yang	台灣山桂花
柿樹科 Ebenaceae	
<i>Diospyros morrisiana</i> Hance	山紅柿
<i>Diospyros oldhamii</i> Maxim.	俄氏柿
安息香科 Styracaceae	
<i>Styrax formosana</i> Matsum.	烏皮九芎
馬錢科 Loganiaceae	
<i>Buddleja asiatica</i> Lour.	揚波
夾竹桃科 Apocynaceae	
<i>Ecdysanthera rosea</i> Hook. & Arn.	酸藤
蘿藦科 Asclepiadaceae	
<i>Marsdenia formosana</i> Masam.	台灣牛彌菜
茜草科 Rubiaceae	
<i>Gardenijasminoides</i> Elis	山黃枝
<i>Hedyotis tenelliflora</i> Blume	纖花耳草
<i>Lasianthus wallichii</i> Wight	圓葉雞屎樹
<i>Mussaenda pubescens</i> W.T. Aiton	毛玉葉金花
<i>Psychotria rubra</i> (Lour.) Poir.	九節木
<i>Rubia akane</i> Nakai	紅藤仔草
<i>Wendlandia formosana</i> Cowan	水金京
旋花科 Convolvulaceae	
* <i>Ipomoea batatas</i> (L.) Lam.	甘藷 (地瓜)
<i>Ipomoea indica</i> (Burm. f.) Merr.	銳葉牽牛
紫草科 Boraginaceae	
<i>Bothriospermum zeylanicum</i> (J. Jacq.) Druce	細纓子草
<i>Thyrocarpus sampsonii</i> Hance	盾果草
<i>Trichodesma calycosum</i> Collett & Hemsl.	假酸漿
馬鞭草科 Verbenaceae	
<i>Callicarpa formosana</i> Rolfe	杜虹花
<i>Callicarpa pilosissima</i> Maxim.	細葉紫珠

學名	中文名
<i>Clerodendrum trichotomum</i> Thunb.	海州常山
唇形科 Labiatae (Lamiaceae)	
<i>Leucas chinensis</i> (Retz.) R. Brown	白花草
<i>Pogostemon formosanus</i> Oliv.	台灣刺蕊草
茄科 Solanaceae	
<i>Lycianthes biflora</i> (Lour.) Bitter	雙花龍葵
# <i>Solanum americanum</i> Miller	光果龍葵
# <i>Solanum capsicoides</i> Allioni	刺茄
* <i>Solanum integrifolium</i> Poir.	紅茄
<i>Solanum lyratum</i> Thunb.	白英
爵床科 Acanthaceae	
<i>Justicia procumbens</i> L.	爵床
<i>Lepidagathis formosensis</i> Clarke ex Hayata	台灣鱗球花
<i>Rungia</i> sp.	明萼草屬
<i>Strobilanthes cusia</i> (Nees) Kuntze	馬藍
<i>Strobilanthes formosanus</i> Moore	台灣馬蘭
苦苣苔科 Gesneriaceae	
<i>Aeschynanthus acuminatus</i> Wall. ex A. DC.	長果藤
<i>Paraboea swinhoii</i> (Hance) Burt	旋莢木
<i>Rhynchoechum discolor</i> (Maxim.) Burt	同蕊草
<i>Titanotrichum oldhamii</i> (Hemsl.) Solereder	俄氏草
車前草科 Plantaginaceae	
<i>Plantago asiatica</i> L.	車前草
忍冬科 Caprifoliaceae	
<i>Sambucus chinensis</i> Lindl.	冇骨消
<i>Viburnum formosanum</i> Hayata	紅籽莢蒾
敗醬科 Valerianaceae	
<i>Patrinia formosana</i> Kitam.	台灣敗醬
菊科 Compositae (Asteraceae)	
# <i>Ageratum houstonianum</i> Mill.	紫花藿香薷
# <i>Bidens pilosa</i> L. var. <i>radiata</i> Sch.	大白花咸豐草
<i>Blumea aromatica</i> DC.	薄葉艾納香
<i>Blumea lanceolaria</i> (Roxb.) Druce	走馬胎
<i>Blumea membranacea</i> DC.	旗山艾納香

學名	中名
<i>Blumea riparia</i> (Blume) DC. var. <i>megacephala</i> Randeria	大頭艾納香
<i>Blumea</i> sp.	艾納香屬
# <i>Chromolaena odorata</i> (L.) R. M. King & H. Rob.	香澤蘭
# <i>Crassocephalum crepidioides</i> (Benth.) S. Moore	昭和草
<i>Dichrocephala integrifolia</i> (L. f.) Kuntze	茯苓菜
# <i>Elephantopus mollis</i> Kunth	地膽草
# <i>Erechtites valerianifolia</i> (Wolf ex Rechb.) DC.	飛機草
<i>Eupatorium clematideum</i> (Wall. ex DC.) Sch. Bip.	田代氏澤蘭
<i>Ixeridium laevigatum</i> (Blume) J. H. Pak & Kawano	刀傷草
<i>Ixeridium transnokoense</i> (Y. Sasaki) J. H. Pak & Kawano	能高刀傷草
<i>Ixeris chinensis</i> (Thunb.) Nakai	兔仔菜
<i>Microglossa pyrifolia</i> (Lam.) Kuntze	小舌菊
# <i>Mikania micrantha</i> H.B. & K.	小花蔓澤蘭
<i>Pterocypsela indica</i> (L.) C. Shih	鵝仔菜
<i>Senecio scandens</i> Buch.-Ham. ex D. Don	蔓黃菀
<i>Sonchus arvensis</i> L.	苦苣菜
<i>Sonchus oleraceus</i> L.	苦蕒菜
# <i>Tithonia diversifolia</i> (Hemsl.) A.Gray	王爺葵
<i>Vernonia cinerea</i> (L.) Less.	一枝香
<i>Vernonia gratiosa</i> Hance	過山龍
<i>Wedelia chinensis</i> (Osbeck) Merr.	蟛蜞菊
<i>Youngia japonica</i> (L.) DC.	黃鶴菜

被子植物 -- 單子葉

百合科 Liliaceae

<i>Asparagus cochinchinensis</i> (Lour.) Merr.	天門冬
<i>Aspidistra elatior</i> Blume	蜘蛛抱蛋
<i>Dianella ensifolia</i> (L.) DC.	山菅蘭
<i>Tricyrtis formosana</i> Baker	台灣油點草

薯蕷科 Dioscoreaceae

* <i>Dioscorea alata</i> L.	大薯
<i>Dioscorea japonica</i> Thunb.	日本山藥
<i>Dioscorea japonica</i> Thunb. var. <i>pseudojaponica</i> (Hayata) Yamam.	基隆山藥

菝葜科 Smilacaceae

學名	中名
<i>Smilax bracteata</i> Prest var. <i>verruculosa</i> (Merr.) T. Koyama	糙莖菝葜
<i>Smilax</i>	菝葜屬
鴨跖草科 Commelinaceae	
<i>Amischotolype hispida</i> (Less. & A. Rich.) Hong	穿鞘花
<i>Commelina communis</i> L.	鴨跖草
<i>Rhopalephora scaberrima</i> (Blume) Faden	毛果竹葉菜
# <i>Setcreasea purpurea</i> Boom	紫錦草
# <i>Zebrina pendula</i> Schnizl.	吊竹草
莎草科 Cyperaceae	
<i>Carex baccans</i> Nees	紅果薹
<i>Carex cruciata</i> Wahl.	煙火苔
<i>Kyllinga brevifolia</i> Rottb.	短葉水蜈蚣
<i>Mariscus sumatrensis</i> (Retz.) J. Raynal	磚子苗
禾本科 Gramineae (Poaceae)	
<i>Arundinella hirta</i> (Thunb.) Tanaka	野古草
<i>Arundo formosana</i> Hack.	台灣蘆竹
* <i>Coix lacryma-jobi</i> L.	薏苡
# <i>Coix lacryma-jobi</i> L. var. <i>maxima</i> Makino	念珠薏苡
<i>Cymbopogon nardus</i> (L.) Rendle	香茅
<i>Cymbopogon tortilis</i> (Presl) A. Camus	扭鞘香茅
<i>Cyrtococcum patens</i> (L.) A. Camus	弓果黍
* <i>Eleusine coracana</i> (L.) Gaertn.	稈子
<i>Ichnanthus vicinus</i> (F. M. Bailey) Merr.	距花黍
<i>Isachne globosa</i> (Thunb.) Ktze.	珍珠粟
<i>Lophatherum gracile</i> Brongn.	淡竹葉
<i>Microstegia</i> sp.	莠竹屬
<i>Miscanthus floridulus</i> (Labill.) Warb. ex K. Schum. & Lauterb.	五節芒
<i>Oplismenus compositus</i> (L.) Beauv.	竹葉草
<i>Oplismenus hirtellus</i> (L.) P. Beauv.	求米草
* <i>Oryza sativa</i> L.	旱稻
* <i>Panicum miliaceum</i> L.	稷
# <i>Paspalum conjugatum</i> Berg.	兩耳草
<i>Phyllostachys makinoi</i> Hayata	桂竹
<i>Pogonatherum crinitum</i> (Thunb.) Kunth	金絲草

學名	中名
* <i>Setaria italica</i> (L.) P. Beauv.	小米
<i>Setaria palmifolia</i> (Koen.) Stapf.	颱風草
* <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench	高粱 (蜀黍)
<i>Thysanolaena latifolia</i> (Roxb. ex Hornem.) Honda	棕葉蘆
* <i>Zea mays</i> L.	玉米
	似油芒
棕櫚科 Palmae (Arecaceae)	
<i>Arenga tremula</i> (Blanco) Becc.	山棕
<i>Calamus quiquetinervius</i> Burret	黃藤
天南星科 Araceae	
<i>Alocasia odora</i> (Lodd.) Spach.	姑婆芋
* <i>Colocasia esculenta</i> (L.) Schott	芋
<i>Colocasia formosana</i> Hayata	台灣青芋
<i>Epipremnum pinnatum</i> (L.) Engl.	拎樹藤
<i>Pothos chinensis</i> (Raf.) Merr.	袖葉藤
* <i>Xanthosoma sagittifolium</i> (L.) Schott	千羊芋
薑科 Zingiberaceae	
<i>Alpinia pricei</i> Hayata	普萊氏月桃
<i>Alpinia zerumbet</i> (Pers.) B. L. Burtt & R. M. Smith	月桃
<i>Hedychium coronarium</i> Koenig	野薑花
蘭科 Orchidaceae	
<i>Bletilla formosana</i> (Hayata) Schltr.	台灣白及
<i>Malaxis matsudae</i> (Yamam.) Hatus.	凹唇軟葉蘭

註：學名前 * 表示該物種為栽培作物，# 表示該物種為外來馴化種。