



# 水稻台中糯46號

Rice Taichung Glutinous 46

撰稿：許志聖、楊嘉凌

一、**品種名稱**：水稻 (*Oryza sativa* L.) 台中糯46號

二、**親 源**：台中糯35號×台中65號

三、**育成時間**：1936年登記推廣

四、**育成者**：

育種工作主持人：末永仁

雜交及後代選拔：藪龜孟男、田村猛

產量試驗：大崎忠一、田村猛

地方試驗：大崎忠一、田村猛

五、**育成經過**：1928年第2期作雜交，1931年第1期作選出，1936年第2期作命名推廣。

六、**品種特性**：適應性廣，品質優良，植株較高，易倒伏，不易脫粒，穀粒稃尖紫黑色，不抗病蟲。

七、**推廣及技術轉移情形**：

1969-1988年間主要於桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、南投、台南、屏東等縣市種植，1978年達最大栽培面積之9,684公頃，1983年後受新命名梗糯稻(台中糯70號等)推廣的影響，栽培面積逐漸減少。依現有資料，種植情形如下：



■ 台中糯46號之植株



■ 台中糯46號之稻穗



■ 台中糯46號之稻穀、糙米、白米



年別	種植面積 (ha)	主要縣市	年別	種植面積 (ha)	主要縣市
1969	5464	台灣地區	1984	2526	中部地區竹苗嘉屏
1970	4940	台灣地區	1985	1900	竹苗中投嘉屏
1971	4915	北宜基高花以外之台灣地區	1986	1346	竹苗中投雲嘉南屏
1972	5499	基南市高花以外之台灣地區	1987	1279	竹苗彰嘉南屏
1973	5632	北基南市高花以外之台灣地區	1988	875	彰投雲南屏
1974	6047	北基南市高花以外之台灣地區	1989	519	北中彰雲南
1975	6129	北基南市高花以外之台灣地區	1990	558	苗彰雲南
1976	5482	北基南市高花以外之台灣地區	1991	439	苗彰
1977	5013	中部地區桃竹苗東屏高市	1992	275	苗彰
1978	9684	中部地區桃竹苗嘉南東屏高市	1993	359	苗中彰
1979	6869	中部地區桃竹苗嘉南高屏花東	1994	261	苗彰
1980	4703	中部地區桃竹苗嘉高屏東	1995	171	苗彰
1981	5028	中部地區桃竹苗嘉南屏花東	1996	61	彰
1982	5925	中部地區宜桃竹苗雲嘉南高屏花東	1997	124	彰
1983	3503	中部地區桃竹苗雲嘉東屏	1998	75	彰

註：1999-2003年僅在苗栗與彰化縣低於50公頃栽培面積